




## Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

### Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

#### Рекомендации гражданам: корь



Корь – вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек.

Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. **От 1 заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек.**

Клинически корь протекает с высокой температурой до 40°С, насморком, конъюнктивитом. С 4-5 дня заболевания появляется сыпь. Характерна этапность высыпания – сначала сыпь появляется за ушами, на лице и шее, далее – грудь и туловище, затем – на руках и ногах.

В последние годы диагноз кори в обязательном порядке подтверждается результатами исследования крови на специфические коревые иммуноглобулины M.

Возникающие осложнения после перенесенной кори развеивают ошибочное представление о кори, как о легком заболевании. **Осложнения наступают у каждого 15 заболевшего корью.** Могут развиваться воспаления уха (отиты), придаточных пазух носа (гаймориты), легких (пневмонии), а также воспаление мозговых оболочек (энцефалиты), приводящие к необратимому повреждению головного мозга. Возможны эпилептические припадки, поражение роговицы глаз и слепота, потеря слуха и др. Бывают и летальные исходы заболевания.

Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является **иммунизация**. В связи с неблагополучной эпидситуацией по кори в зарубежных странах в целях предупреждения распространения коревой инфекции на территории страны по поручению Правительства Российской Федерации Роспотребнадзором разработано и утверждено постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.03.2019 № 2 «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации». может любой гражданин Российской Федерации, не болевший корью, не получивший прививки против кори ранее в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и не имеющий сведений о прививках против кори.

Плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из «групп риска» – работники лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом.

**Необходимо иметь две прививки против кори документально подтвержденных. Не привитые в детстве взрослые прививаются двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.**

**После двух введений вакцины иммунитет формируется в 95 % случаев, после одного введения – в 69-81%. Длительность иммунитета после вакцинации – не менее 20 лет и по некоторым данным - пожизненная (сравнима с таковым при естественной инфекции).**

Угрозе заболевания подвергаются не болевшие корью, не привитые или привитые однократно. Особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до 1 года, не подлежащих прививкам по возрасту, а также для детей до 5 лет, относящихся к «группе риска» в связи с риском возникновения осложнений.

В окружении больного прививкам против кори подлежат все лица, имевшие даже кратковременный контакт с заболевшим, без ограничения возраста, не болевшие корью ранее, не привитые или привитые против кори однократно. Прививки проводятся в первые 72 часа с момента выявления больного.

Детям, не привитым против кори по возрасту или не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от прививок, вводится иммуноглобулин человека нормальный не позднее 5-го дня с момента контакта с больным.

Свой иммунный статус (наличие защитных антител) по кори можно узнать, если провести анализ крови на коревые антитела (иммуноглобулины G).

Для предупреждения кори лицам, выезжающим за рубеж, не болевшим корью, не привитым, а также привитым однократно, необходимо привиться не менее чем за 10 дней до отъезда.

**Будьте внимательны к своему здоровью. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью при возникновении заболевания, чтобы избежать осложнений и не заразить окружающих. Сделать прививку и предупредить заболевание или облегчить течение болезни проще, чем подвергать себя риску заболеть тяжелой формой кори.**

# Корь



**Корь** – острое тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией, катаральным поражением верхних дыхательных путей, поэтапным появлением сыпи. Инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании, плаче на расстоянии до 5-8 м от источника инфекции.

Ранее корь считалась исключительно детской инфекцией, тенденция последних лет показывает нарастание среди заболевших подростков и взрослых.

К кори восприимчивы все неболевшие люди любого возраста. У переболевших корью создается стойкий пожизненный иммунитет.

Активный иммунитет формируется и в результате вакцинации живой коревой вакциной.

В России разработана национальная программа ликвидации кори.

*Основные цели программы:*

- Достижение высокого уровня охвата населения прививками живой коревой вакциной.

*Вакцинации подлежат:*

- дети в возрасте 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет.
- подростки и взрослые до 35 лет, не болевшие; не привитые и не имеющие сведений о прививке против кори, а также о том, болели ли они корью.
- контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори – без ограничения по возрасту.

**Абсолютных противопоказаний к вакцинации нет.**

**Обратитесь своевременно к участковому врачу  
и сделайте прививку!**

# КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ПРИ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ КОРЬЮ

## УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

## ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ЗАЩИТУ



Нет прививки противокоревой вакциной и противопоказаний к вакцинации



Нет прививки противокоревой вакциной, но есть противопоказания к вакцинации



Есть одна прививка противокоревой вакциной



Есть две прививки от кори

В первые трое суток после контакта с больным корью нужно ввести 1 дозу вакцины. Если прошло более 72 часов, все равно не стоит отказываться от прививки.

В первые шесть суток после контакта с больным корью нужно провести иммунопрофилактику противокоревым иммуноглобулином. Введение иммуноглобулина позже этого срока будет менее эффективным.

Как можно скорее ввести вторую дозу противокоревой вакцины.

Ребенок защищен и в дополнительной вакцинации от кори не нуждается.

- до появления противокоревой прививки болезнь уносила более 2 млн жизней в год
- восприимчивость людей к вирусу кори крайне высока
- заболевание корью страшно своими ОСЛОЖНЕНИЯМИ

## Осторожно, корь!



Самый эффективный способ профилактики -  
прививка  
Она необходима:

детям от 12  
до 18  
месяцев

-взрослым, не делавшим  
прививку в детстве;  
-взрослым с низким  
количеством антител к кори  
в крови (можно измерить,  
сдав анализ)

### Осложнения при кори:

- тяжелое воспаление легких (пневмония)
- серьезные заболевания нервной системы (менингит, энцефалит)
- воспаление среднего уха (отит, евстахиит)
- поражение гортани (ларингит)
- хронические заболевания кишечника

### СИМПТОМЫ:

- лихорадка
- слабость
- недомогание
- распространенная по телу сыпь
- поражение дыхательных путей и глаз

Осложнения способны привести к смерти и инвалидизации!

# КОРЬ

– это **высокопатогенное, опасное** заболевание



Корь передается в **6 РАЗ**  
легче, чем грипп.

У КАЖДОГО  
ПЯТОГО



заболевшего корью развиваются **осложнения**, такие как ушные инфекции, пневмония, необратимая потеря слуха или энцефалит, вплоть до летального исхода.



Наибольший риск **опасных осложнений** угрожает детям до 5 лет и взрослым старше 20 лет.



Против кори существуют **безопасные и эффективные** вакцины. Они проходят тщательные испытания, и за **50 лет использования** зарекомендовали себя как очень безопасные.



Две дозы вакцины против кори способны обеспечить **защиту** от болезни практически на 100%.